



האוניברסיטה העברית בירושלים,
הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית
המכון למדעי הצמח והגנטיקה בחקלאות ע"ש רוברט ה. סמית
רחובות

השפעת טמפרטורה על עמידות שאינה תלויה באתר מטרה למעכבי ACCase בעשבים דגניים

מאור מצרפי, ברוך רובין וצבי פלג

שינויי אקלים

- התחממות גלובלית

- זמינות מים

- פחיתת יבול חיטה ב-6% עם כל


עליית מעלה (Asseng *et al.*, 2014)

- צמחים פולשים



עשבים רעים וקוטלי עשבים

- נזקי יכול כתוצאה משיבוש בעשבים-גורמים לנזק הביוטי הרב ביותר (Oerke, 2006)
- שימוש יתר בקוטלי עשבים המביא לעמידות-קשורה (TS) ושאינה קשורה באתר המטרה (NTS)
- מנגנוני הגנה תלויי טמפרטורה בצמח (תנועה, פירוק)









מטרה

בירור מנגנון העמידות שאינה קשורה באתר מטרה
למעכבי ACCase בעשבים דגניים

- ביסוס השימוש בעוקצר כצמח מודל להבנת מנגנוני עמידות (Matzrafi et al., 2014)
- הבנת הקשר בין טמפרטורה לעמידות לקוטלי עשבים
- זיהוי הגנים המעורבים בתהליך

תוצאות



אילוכסן

R (TS)

R (NTS)

S





S

אוכלוסיות זון

מנגנון העמידות





Brl- 638

S



Brl- 782

R (NTS)



אקסיאל (P)
עם וללא מלתיאון
(M)

10/16°C

16/22°C

22/28°C

28/34°C

קווי יולר
ראקציה

האם תהליכי הפירוק תלויים בזמן?

- גנים הקשורים לפירוק (GST, P450)

- רגולציה

- רמת ביטוי

- קצב פירוק

PUGH



'I wouldn't worry, you haven't got a metabolic rate'

הזמן הנדרש לפירוק קוטל העשבים אקסיל



21 יום
מטיפול



מסקנות

- הצלחת השימוש בצמח המודל עוקצר ככלי להבנת מנגנוני עמידות לקוטלי עשבים
- ההתחממות הגלובלית תביא לעלייה ברמת העמידות/סבילות לקוטלי עשבים (דגני חורף)
- פירוק קוטל העשבים נמצא כתלוי זמן וטמפרטורה (פרקטיקה חקלאית)



תודות

משה סיבוני

קובי גולדווסר

אייל פרנקל

תום קליפר

עוזי נפתליהו

עידן ריצ'קר

אדמה פתרונות לחקלאות

צוות המעבדות רובין/פלאג

קרן המדען הראשי של משרד החקלאות

שאלות?